



**Microbac Europe B.V. – Dorsvloerweg 435, 2661 MN Bergschenhoek, Nederland**

+31 10 418 46 52

## **Aplicación Biomicrobes 08 (Suelo & Sustrato)**

Biomicrobes 08 se aplica para activar la microbiología del suelo y mejorar el desarrollo radicular. Puede aplicarse a través del riego por goteo, en el riego de establecimiento al trasplantar o como pulverización sobre el sustrato.

En el trasplante se recomienda una dosis inicial de 8 L/ha. A las dos semanas, aplicar una dosis de refuerzo de 4 L/ha. Despues, continuar con una dosis de mantenimiento mensual de 4 L/ha mediante el sistema de riego.

**Importante: La primera aplicación siempre es doble. Utilizar suficiente agua para que el producto llegue a la zona radicular. No mezclar con fungicidas ni fitosanitarios.**

Aplicación	Dosis por ha	Dosis en tanque	Frecuencia
Dosis inicial	8 L/ha	800 ml / 100 L 1600 ml / 200 L 3200 ml / 400 L	En el trasplante
Dosis de refuerzo	4 L/ha	400 ml / 100 L 800 ml / 200 L 1600 ml / 400 L	Una vez a las 2 semanas
Dosis de mantenimiento	4 L/ha	Igual	Mensual



info@biomicrobes.com

www.biomicrobes.com